





โรคไข้หวัดนก

โสภิตา นามสวัสดิ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7



เมื่อพบสัตว์ป่วยตาย



App DLD
หรือสายด่วน
096-3011946

▶ แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

▶ แยกตัวป่วยออกจากฝูง



▶ ทำลายและฝังกลบซากสัตว์พร้อม **พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ**



▶ ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมา
ปรุงอาหารเด็ดขาด!!!



▶ เข้มงวดในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ



เช่น ไม่เคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้าออกฟาร์ม

ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังสัมผัสสัตว์ปีก



เกิดจาก

เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าเอ (Influenza A virus)
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง
และโรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง



สัตว์ปีกทุกชนิดสามารถเป็นโรคนี้ได้ ทั้งนี้เปิด
และนกที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ แต่จะขับเชื้อ
ออกมาทางอุจจาระได้

การติดต่อ



ติดต่อได้ผ่านเยื่อจมูก ตา หรือปากขณะกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจากสิ่งคัดหลั่ง
จากสัตว์ป่วย เช่น อุจจาระ น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือ
ตายโดยตรง

อาการ



ตายฉับพลัน



หิวบวม ตาบวม
หายใจลำบาก



ชัก คอบิด



หงอนและเหนียงเปลี่ยนเป็นสีม่วง
มีจุดเลือดออกตามเชิง



ท้องเสีย



ขนยุ่ง ซึม เบื่อ
อาหาร



ไข่สด ไข่ผิดปกติ



การป้องกัน

1. เลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพแข็งแรง



ให้อาหารที่มีคุณภาพ และทำ **วัคซีนป้องกันโรค** ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด



2. โรงเรือนมีที่ **ป้องกันลมและฝน** ได้

3. มี **ตาข่ายและรั้วล้อม** ป้องกันสัตว์อื่นเข้า



4. **แยกเลี้ยง** สัตว์ปีกที่เข้ามาใหม่ หรือนำไปชนแล้วกลับ

มา เป็นเวลา **7 วัน** ก่อนนำเข้าฝูง



5. มี **อ่างน้ำยา** จุ่มเท้าก่อนเข้าออก

