สรุปแนวทางการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ 0610.07/ว8953 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

หนังสือที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. หนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ 0610.07/ว8953 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า (จำนวน 36 หน้า)

2. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว11910 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2564 เรื่อง การผ่อนปรนการขออนุญาตนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ในพื้นที่อำเภอปลายทางที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมาก

3. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม

4. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว1398 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2564 เรื่อง ขอแก้ไขมาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม

5. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0621/ว37038 ลงวันที่ 30 ต.ค. 63 เรื่อง เข้มงวดตรวจสอบเอกสารก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักร และนำออกนอกราชอาณาจักร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการดังนี้

- 1. ซักซ้อมแนวทางการเผชิญเหตุ กรณีพบสถานการณ์ความเสี่ยงสูงมาก
- 2. เตรียมคำสั่งให้พร้อม เช่น คำสั่งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ คำสั่งฯ ทำลายสัตว์
- 3. เตรียมสถานที่ฝังทำลายซากสุกรและทวนสอบว่าใช้งานได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการดังนี้ (ต่อ)

- 4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่ในพิจารณาประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
- ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามรับรองในรายงานผลการประเมิน **(แก้ไขเป็นปศุสัตว์จังหวัด เท่านั้น** ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม)
- หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ฯ อนุญาตเคลื่อนย้ายได้ภายในจังหวัดเท่านั้น
- คะแนนประเมินความเสี่ยงใช้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ทำการประเมิน

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ ๒๘/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเกษตรกร รวมทั้งไม่กระทบกับประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันและทรัพยากรที่มี ปศุสัตว์จังหวัดจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด

(๑) ปศุสัตว์จังหวัด ประธานกรรมการ
(๒) ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ กรรมการ
(๓) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรรมการ
(๔) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรรมการ
(๕) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กรรมการและเลขานุการ

๒. ให้คณะกรรมการประเมินฯ ตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever (ASF)

(๒) ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามรับรองในรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า

(๓) คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยงทรัพยากรของจังหวัดและศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของห้องปฏิบัติการ

(๔) การประเมินความเสี่ยงต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในระดับอำเภอที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ออกประกาศทุกวันจันทร์

(๕) อื่นๆ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนัส เทพรักษ์)
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

5. ขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยระบบ E-Smart Plus

รายงานผลการสำรวจขึ้นทะเบียนฟาร์มสุกร และประเมินความเสี่ยงระดับฟาร์ม

ผ่าน APP : E-Smart plus วันที่ 01-09-2020 - วันที่ 31-03-2021

จังหวัด	เป้าหมายในระบบครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์ (ปี 2563)		ผลการขึ้นทะเบียน (ขึ้นทะเบียนแล้ว)				จำนวนฟาร์มที่ประเมินความเสี่ยง					
	จำนวน (ฟาร์ม)	จำนวน (ตัว)	จำนวน (ฟาร์ม)	คิดเป็น %	จำนวน (ตัว)	คิดเป็น %	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	รวม
กาญจนบุรี	2,080	364,257	1,973	94.86	254,591	69.89	2	82	54	0	0	138
นครปฐม	576	167,192	600	104.17	260,157	155.60	6	15	36	0	0	57
ประจวบคีรีขันธ์	1,831	126,779	1,224	66.85	105,057	82.87	10	560	1	0	0	571
เพชรบุรี	984	129,794	1,238	125.81	133,029	102.49	92	229	75	1	0	397
ราชบุรี	1,126	2,150,268	2,125	188.72	2,779,062	129.24	0	0	0	0	0	0
สมุทรสงคราม	12	2,875	8	66.67	2,365	82.26	0	0	0	0	0	0
สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สุพรรณบุรี	1,878	448,900	2,039	108.57	417,389	92.98	0	11	7	0	0	18
รวม	8,487	3,390,065	9,207	108.48	3,951,650	116.57	110	897	173	1	0	1,181

ต้องมีข้อมูลที่ตั้งโรงฆ่าสุกร ร้านจำหน่ายเนื้อสุกร ร้านจำหน่ายอาหารและยาสัตว์

- แผนที่แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประกอบด้วย ฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร โรงอาหารสุกร ด่านกักกันสัตว์และจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค (กำลังเพิ่มเติมที่พักซากสุกร ร้านจำหน่ายเนื้อสุกร ร้านจำหน่ายอาหารและยาสัตว์)
- http://region7.dld.go.th/webnew/dataanimals.html

ตารางที่ 5-1 จำนวนเกษตรกรและสุกร รายจังหวัด ปี 2563

จังหวัด	สุกร												
	พื้นเมือง		สุกรพันธุ์						สุกรขุน			รวม	
	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ราย)	พ่อพันธุ์ (ตัว)	แม่พันธุ์ (ตัว)	ลูกสุกรเพศผู้ (ตัว)	ลูกสุกรเพศเมีย (ตัว)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ราย)	สุกรขุน (ตัว)	ลูกสุกรขุน (ตัว)	เกษตรกร (ราย)	จำนวน (ตัว)	เกษตรกร (ราย)
เขต 7	9,891	980	8,866	307,237	988	3,315	320,406	4,425	2,327,856	731,912	6,266	3,390,065	8,487
ราชบุรี	494	87	4,626	198,521	4	1,671	204,822	722	1,382,894	562,058	946	2,150,268	1,126
กาญจนบุรี	1,817	229	945	31,344	334	478	33,101	1,001	285,552	43,787	1,470	364,257	2,080
สุพรรณบุรี	3,308	197	1,166	36,955	79	146	38,346	889	356,298	50,948	1,458	448,900	1,878
นครปฐม	1,079	106	758	12,517	397	538	14,210	330	121,267	30,636	432	167,192	576
สมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมุทรสงคราม	53	6	11	329	12	10	362	4	2,220	240	5	2,875	12
เพชรบุรี	549	45	490	12,354	42	61	12,947	425	96,489	19,809	800	129,794	984
ประจวบคีรีขันธ์	2,591	310	870	15,217	120	411	16,618	1,054	83,136	24,434	1,155	126,779	1,831

ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP และ GFM

จังหวัด	ขึ้นทะเบียนใน E-Smart plus		ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GAP		ฟาร์มสุกรที่ได้รับรอง GFM		รวม GAP , GFM	
	จำนวน (ฟาร์ม)	จำนวนสุกร (ตัว)	จำนวน (ฟาร์ม)	จำนวนสุกร (ตัว)	จำนวน (ฟาร์ม)	จำนวนสุกร (ตัว)	จำนวน (ฟาร์ม)	จำนวนสุกร (ตัว)
กาญจนบุรี	1,967	255,926	66	173,662	31	16,930	97	190,592
นครปฐม	608	261,801	43	92,869	56	29,211	99	122,080
ประจวบคีรีขันธ์	1,234	105,029	38	58,250	104	25,346	142	83,596
เพชรบุรี	1,253	143,862	46	51,159	32	2,193	78	53,352
ราชบุรี	2,124	2,777,552	89	1,127,441	29	119,806	118	1,247,247
สมุทรสาคร	0	0	0	0	1	6	1	6
สมุทรสงคราม	8	2,365	0	0	2	1,530	2	1,530
สุพรรณบุรี	2,006	415,993	88	172,199	9	3,537	97	175,736
รวม	9,200	3,962,528	370	1,675,580	264	198,559	634	1,874,139

รายงานการขึ้นทะเบียน

จังหวัด	จุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่โรงฆ่าสุกร (แห่ง)			รถขนอาหารสัตว์ (ราย)	ผู้รวบรวมสุกรและยานพาหนะ (ราย)
	มี	ไม่มี	รวม		
เพชรบุรี	15	6	21	68	7
สุพรรณบุรี	11	0	11	8	2
ราชบุรี					
กาญจนบุรี					
นครปฐม	25	3	28		97
ประจวบคีรีขันธ์					
สมุทรสาคร					
สมุทรสงคราม					
รวม					

รายงานผลการขึ้นทะเบียนจุดพ่นยาฆ่าเชื้อที่โรงฆ่าสุกร จังหวัดนครปฐม

ที่	ขื่อโรงฆ่าสุกร	ชื่อ-นามสกุล เจ้าของ		ที่ตั้งโรงฆ่าสุกร				จุดพ่นยาฆ่าเชื้อ	
		คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน(จุด)	มี/ไม่มี
1	โรงฆ่านงนุช (เจ๊นุช)	นาง	นงนุช สามสาหร่าย	27/7.	9	ตาก้อง	เมือง	1	มี
2	โรงฆ่าไพรัตน์ (เจ๊เล็ก)	นาย	ไพรัตน์ ก้องภักดีสุข			ตาก้อง	เมือง	1	มี
3	โรงฆ่าสมพล	นาย	สมพล ถ้ำน้อย	23/1.	6	มาบแค	เมือง	2	มี
4	โรงฆ่าวีรวรรณ (เฮียโป้ง)	นาง	วีรวรรณ นิเวศปฐมวัฒน์	441		บ่อพลับ	เมือง	1	มี
5	โรงฆ่าจีราวรรณ (กำนันหลี)	นางสาว	จีราวรรณ เชื่อมวรศาสตร์	67	6	มาบแค	เมือง	1	มี
6	โรงฆ่านิภา	นางสาว	นิภา อาภรณ์อักษรกิจ	2		บ่อพลับ	เมือง	1	มี
7	นางสาวขวัญใจ โสมกุล	นางสาว	ขวัญใจ โสมกุล	75	5	ลำเหย	ดอนตูม	1	มี
8	บ.คิว เอ็ม พี จำกัด	บ.คิว เอ็ม พี จำกัด		140/1	6	สามง่าม	ดอนตูม	2	มี

รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้รวบรวมสุกรและพาหนะ จังหวัดนครปฐม

ที่	ชื่อ-นามสกุล ผู้รวบรวมสุกร		ที่อยู่ผู้รวบรวมสุกร				รถสำหรับรวบรวมสุกร							
	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จำนวน (คัน)	ประเภทรถ					ทะเบียนรถ	เครื่องพ่นยา(มี/ไม่มี)
								กระบะ	4 ล้อใหญ่	6 ล้อ	10 ล้อ	รถพ่วง		
1	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		36	6	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	6		√				ผข 9856 นฐ	มี
										√			89-0402 นฐ	มี
2	นาย	ธเนตร์ ปฐมชัยวาลย์	13	7	สระสี่มุม	กำแพงแสน	2	√					2ฒต 521 กทม.	มี
										√			71-5331 นฐ	มี
3	บริษัท สุริยัณห์ฟาร์ม 2014 จำกัด		120	19	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	4				√		83-5776 ราชบุรี	มี
											√		90-1203 นฐ	มี
4	นาย	ณัฐพงษ์ ธนานิรันดร์กุล	20	5	ห้วยขวาง	กำแพงแสน	1				√		89-5127 นฐ	มี
5	นาย	พันธ์พัฒน์ รัตนทับทิมทอง	139	19	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	1			√			89-7857 นฐ	มี
6	นาย	วีรชัย เหล่าธนกิจ	2/1	3	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	1				√		85-3237 นฐ	มี
7	บริษัทไทย พรีเมี่ยม อกรีเทรด จำกัด		189	4	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	4				√		89-8051 นฐ	มี
											√		71-5633 นฐ	มี
											√		83-6023 ปทุมธานี	มี
											√		89-8998 นฐ	มี

จุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

จุดถาวร

ชื่อจุด	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	Y Lat	X Long
ศรีประจันต์	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	14.634554	100.151468
ชะอำ	เขาใหญ่	ชะอำ	เพชรบุรี	12.828384	99.936069
ห้วยยาง	ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	11.608736	99.663856
ไชยราช	ไชยราช	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	10.971659	99.324948
ทุ่งกระพังโหม	ทุ่งกระพังโหม	กำแพงแสน	นครปฐม	13.990637	99.994601
พุน้ำร้อน	บ้านเก่า	เมือง	กาญจนบุรี	13.920761	99.086044

จุดเสริม

ชื่อจุด	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	Y Lat	X Long
สาลี	สาลี	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	14.321768	100.220082
ท่าเรือ	ท่าเรือ	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	13.948819	99.757627
ดอนกระเบื้อง	ดอนกระเบื้อง	โพธาราม	ราชบุรี	13.763138	99.928843
แพรกหนามแดง	แพรกหนามแดง	อัมพวา	สมุทรสงคราม	13.344984	99.869070
แก่งกระจาน	วังจันทร์	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	12.934392	99.768267
ท่ายาง	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	12.72471	99.901361
ห้วยกระเจา	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	14.331927	99.734281
นายโกศล	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	14.618472	100.006098
ต.บางกุ้ง อู่ทอง	บางกุ้ง	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	14.453718	100.009322



รายงานการเคลื่อนย้ายสุกรออกจากจังหวัด
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563

จังหวัด	เลี้ยง		เข้าโรงฆ่า		ส่งออก		รวม	
	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว
ราชบุรี	238	84826	4916	366603	88	10780	5242	462209
กาญจนบุรี	164	36677	936	70112	32	3990	1132	110779
สุพรรณบุรี	84	21482	1058	88147	396	61188	1538	170817
นครปฐม	82	18619	1343	50563	0	0	1425	69182
เพชรบุรี	44	16410	251	10633	0	0	295	27043
ประจวบคีรีขันธ์	20	5429	424	20537	0	0	444	25966
สมุทรสาคร	3	45	0	0	0	0	3	45
สมุทรสงคราม	3	9	18	663	0	0	21	672
รวม	638	183497	8946	607258	516	75958	10100	866713

จำนวนใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตในปี 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนใบเคลื่อนย้าย (ฉบับ)
1	นครปฐม	13006
2	ราชบุรี	45938
3	กาญจนบุรี	10278
4	สุพรรณบุรี	14437
5	เพชรบุรี	3692
6	ประจวบคีรีขันธ์	4608
7	สมุทรสาคร	13
8	สมุทรสงคราม	139
รวม		92111

การประเมินความเสี่ยงของโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2021 ถึง 23 พฤษภาคม 2021



การประเมินความเสี่ยงของโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2021 ถึง 30 พฤษภาคม 2021



การประเมินความเสี่ยงของโรคระบาดที่สำคัญในสุกร
ประจำวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2564

#	ปศุสัตว์เขต	รหัสอำเภอ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับความเสี่ยง (อำเภอ)
713	7	7001	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	สูงมาก
714	7	7002	จอมบึง	ราชบุรี	สูง
715	7	7003	สวนผึ้ง	ราชบุรี	สูงมาก
716	7	7004	ดำเนินสะดวก	ราชบุรี	สูงมาก
717	7	7005	บ้านโป่ง	ราชบุรี	สูงมาก
718	7	7006	บางแพ	ราชบุรี	สูงมาก
719	7	7007	โพธาราม	ราชบุรี	สูงมาก
720	7	7008	ปากท่อ	ราชบุรี	สูง
721	7	7009	วัดเพลง	ราชบุรี	สูง
722	7	7010	บ้านคา	ราชบุรี	สูง
723	7	7101	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	สูง
724	7	7102	ไทรโยค	กาญจนบุรี	ปานกลาง
725	7	7103	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	สูง
726	7	7104	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	ปานกลาง
727	7	7105	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	สูง
728	7	7106	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	สูง
729	7	7107	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	สูง
730	7	7108	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	สูงมาก
731	7	7109	พนมทวน	กาญจนบุรี	สูงมาก
732	7	7110	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	สูง
733	7	7111	ด่านมะขามเตี้ย	กาญจนบุรี	สูง
734	7	7112	หนองปรือ	กาญจนบุรี	สูง
735	7	7113	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	สูง
736	7	7201	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	สูง
737	7	7202	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	ปานกลาง
738	7	7203	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	ปานกลาง
739	7	7204	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	สูงมาก
740	7	7205	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	สูง
741	7	7206	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	สูงมาก
742	7	7207	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	สูงมาก
743	7	7208	สามชุก	สุพรรณบุรี	สูง
744	7	7209	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	สูง
745	7	7210	หนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี	สูง

การประเมินความเสี่ยงของโรคระบาดที่สำคัญในสุกร
ประจำวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2564

#	ปศุสัตว์เขต	รหัสอำเภอ	อำเภอ	จังหวัด	ระดับความเสี่ยง (อำเภอ)
746	7	7301	เมืองนครปฐม	นครปฐม	สูง
747	7	7302	กำแพงแสน	นครปฐม	สูง
748	7	7303	นครชัยศรี	นครปฐม	ปานกลาง
749	7	7304	ดอนตูม	นครปฐม	ปานกลาง
750	7	7305	บางเลน	นครปฐม	สูง
751	7	7306	สามพราน	นครปฐม	สูง
752	7	7307	พุทธมณฑล	นครปฐม	ปานกลาง
753	7	7401	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	สูงมาก
754	7	7402	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	สูง
755	7	7403	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	สูง
756	7	7501	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	สูง
757	7	7502	บางคนที	สมุทรสงคราม	สูง
758	7	7503	อัมพวา	สมุทรสงคราม	สูง
759	7	7601	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	สูงมาก
760	7	7602	เขาย้อย	เพชรบุรี	สูงมาก
761	7	7603	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	สูง
762	7	7604	ชะอำ	เพชรบุรี	สูงมาก
763	7	7605	ท่ายาง	เพชรบุรี	สูงมาก
764	7	7606	บ้านลาด	เพชรบุรี	สูง
765	7	7607	บ้านแหลม	เพชรบุรี	สูง
766	7	7608	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	สูง
767	7	7701	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	สูงมาก
768	7	7702	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	สูงมาก
769	7	7703	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	สูง
770	7	7704	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	ปานกลาง
771	7	7705	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	ต่ำ
772	7	7706	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	สูง
773	7	7707	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	สูง
774	7	7708	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	สูงมาก

การปรับเปลี่ยนระดับความเสี่ยงในระดับอำเภอ (ประกาศทุกวันจันทร์)

- 1. กรณีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ได้มีการปรับเปลี่ยนระดับความเสี่ยงในระดับอำเภอ ภายหลังการยื่นคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (ร.1) ให้ดำเนินการ ดังนี้
- (1) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามระดับความเสี่ยงเดิม โดยพิจารณา ณ วันที่ยื่น **ร.1** โดย
- (1.1) กรณีขอเข้าโรงฆ่าสัตว์สามารถยื่น ร.1 ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ)
- (1.2) กรณีขอไปเลี้ยงสามารถยื่น ร.1 ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ)
- หากออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายล่วงหน้าให้กำหนดเวลาใช้ได้ต้องไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันอาทิตย์ (เช่น ถ้าเริ่มอนุญาตให้เคลื่อนย้ายวันเสาร์ ที่ 3 เม.ย. 64 เวลา 13.00 จะใช้ได้ถึงวันจันทร์ ที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. (ปกติ ใบเคลื่อนย้ายมีอายุ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง) แต่กรณีนี้วันหมดอายุคือวันอาทิตย์ ที่ 4 เม.ย. 64 เวลา 24.00 น.)
- กรณีที่ฟาร์มต้นทางและฟาร์มปลายทางเป็นฟาร์มที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากหรือตั้งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามระดับความเสี่ยง **ปัจจุบัน (3 เดือน ถึงจะปรับลดเป็นระดับเสี่ยงสูง)**

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการดังนี้ (ต่อ)

- 6. แจ้งแผนการเฝ้าระวังโรคผ่านปศุสัตว์เขตไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ
- 6.1 ระยะเร่งด่วน
- 6.2 การเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ภาวะปกติ

6.1 การเฝ้าระวังระยะเร่งด่วนในโรงฆ่าสุกร ในช่วง 1 เดือนแรกภายหลังพบความเสี่ยงสูงมากในพื้นที่จังหวัด (ให้สอบสวนโรคย้อนหลังกลับไปอย่างน้อย 30 วัน)

<table>
<tr><th>สัปดาห์ที่</th><th>สูงมาก</th><th>สูง</th><th>ปานกลาง</th><th>ต่ำ</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">surface swab ทุกโรงฆ่า ๆ ละ 1 ครั้ง</td></tr>
<tr><td>2 - 4</td><td>surface swab ทุกโรงฆ่า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง</td><td colspan="3">surface swab ทุกโรงฆ่า ๆ ละ 1 ครั้ง
(ในช่วง 3 สัปดาห์ เก็บ 1 ครั้ง)</td></tr>
<tr><td>พบความเสี่ยงสูงมากในฟาร์มสุกรเพิ่มเติมภายใน 1 เดือน</td><td colspan="4">ไม่ต้องดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวัง</td></tr>
<tr><td rowspan="2"><u>พบ</u>ความเสี่ยงสูงมากในฟาร์มสุกรเพิ่มเติม<u>หลังจาก 1 เดือน</u>
- สัปดาห์ ที่ 1</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">surface swab ทุกโรงฆ่า ๆ ละ 1 ครั้ง</td></tr>
<tr><td>- สัปดาห์ ที่ 2 - 4</td><td>swab ทุกโรงฆ่า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง</td><td colspan="3">swab ทุกโรงฆ่า ๆ ละ 1 ครั้ง (ในช่วง 3 สัปดาห์ เก็บ 1 ครั้ง)</td></tr>
<tr><td><u>ไม่พบ</u>ความเสี่ยงสูงมากในฟาร์มสุกรเพิ่มเติม <u>หลังจาก 1 เดือน</u></td><td><u>สูงมากและเชื่อมโยงโดยตรง</u>
1. ชะลอการนำสุกรเข้าฆ่า ทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค swab 2 ครั้งวันที่ 0 และ 1
<u>ไม่เชื่อมโยง</u>
1. ทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบรอยโรคให้ส่งตรวจ
4. โรงฆ่าใดรับสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมาก ให้ swab และเจาะเลือด 5 ตัวต่อฟาร์ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</td><td colspan="3">1. ทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค
2. surface swab 1 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน
3.เฝ้าระวังทางอาการ
4. โรงฆ่าใดรับสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมาก ให้ swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเจาะเลือด 5 ตัวต่อฟาร์ม จนกว่าจะไม่มีสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า ติดต่อกัน 2 สัปดาห์</td></tr>
</table>

การดำเนินการเมื่อตรวจพบความเสี่ยงสูงมากในโรงฆ่าสุกร ตามแผนการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในระยะเร่งด่วน

- 1. ให้สัตวแพทย์พื้นที่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำสุกรหรือหมูป่าเข้าฆ่า
- 2. ทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค
- 3. เก็บตัวอย่างพื้นผิว (surface swab) จำนวน 3 บริเวณ จำนวน 2 ครั้งในวันที่ 0 และวันที่ 1
- 4. ระบุในใบส่งตัวอย่าง “เป็นตัวอย่างสำหรับกิจกรรมชันสูตร”
- 5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบทั้งสองครั้งจึงจะพิจารณาให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
- 6. สอบสวนให้ทราบสาเหตุของการพบความเสี่ยงสูงมากและสอบข้อมูลย้อนหลัง 30 วันว่ามีฟาร์มใดบ้างที่นำสุกรหรือหมูป่าเข้าฆ่าที่โรงฆ่าและดำเนินการสอบสวนฟาร์มที่เกี่ยวข้อง

6.2 การเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ภาวะปกติ

6.2.1 การเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอที่พบความเสี่ยงสูงมาก

สถานประกอบการ	เสี่ยงสูงมาก	เชื่อมโยงโดยตรง	ไม่เชื่อมโยง		
			ภายในรัศมี 1 กม.	รัศมี 1 – 5 กม.	รัศมีมากกว่า 5 กม. (แต่อำเภอเดียวกัน)
ฟาร์ม	1. ทำลาย 2. สอบสวน	1. บันทึกสั่งกัก 2. เจรจาขอทำลาย 3. swab 3 ครั้ง ในวันที่ 1 , 7 และ 14 4. เฝ้าระวังทางอาการ	1. บันทึกสั่งกัก 2. เจรจาขอทำลาย 3. swab 2 ครั้ง ในวันที่ 7 และ 14 4. เฝ้าระวังทางอาการ	1. บันทึกสั่งกัก 2. surface swab 1 ครั้ง ในวันที่ 7 4. เฝ้าระวังทางอาการ	1. เฝ้าระวังทางอาการ หากพบสุกรป่วยตายตามนิยามให้เก็บเลือดสุกรป่วย จำนวน 15 ตัวอย่าง
รถขนส่ง	1. surface swab		ไม่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง		
โรงฆ่าสุกร	1. ขอความร่วมมือชะลอการนำสุกรเข้าฆ่า 2. ทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค 3. swab จำนวน 2 ครั้งในวันที่ 0 และวันที่ 1		1. ขอความร่วมมือทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค 2. swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เป็นเวลา 3 เดือน) 3. โรงฆ่าใดรับสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมาก **swab** และเจาะ**เลือด5 ตัวต่อฟาร์ม** สัปดาห์ละ 1 ครั้ง		
สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร	1. ขอความร่วมมือชะลอการจำหน่าย 2. ทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค 3. swab จำนวน 2 ครั้งในวันที่ 0 และวันที่ 1		1. swab 3 บริเวณ ๆละ 5 ตำแหน่ง ทุกสัปดาห์ๆละ 10 แห่ง (3 เดือน) 2. ระหว่างการเฝ้าระวังสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ		
ร้านจำหน่ายอาหารสุกร	1. surface swab จำนวน 1 ครั้ง		ไม่ต้องมีการเก็บตัวอย่าง		

หมายเหตุ 1. การเชื่อมโยงโดยตรง เช่น ฟาร์ม รถขนส่งสุกร รถขนส่งอาหาร โรงฆ่า ร้านจำหน่ายเนื้อสุกร พ่อค้า ร้านขายวัตถุดิบ

2. นิยามโรค ASF ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดจำนวนและลักษณะ ฯ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

3. หากพบสุกรป่วยตาย**ตามนิยาม**ให้เก็บเลือดสุกรป่วย จำนวน 15 ตัวอย่างต่อฟาร์ม เก็บกระจายให้ทั่วทั้งฟาร์ม

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง กำหนดจำนวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสุกรหรือหมูป่า
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดจำนวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสุกรหรือหมูป่า เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ สุกร หรือหมูป่า ที่เลี้ยงแบบระบบฟาร์มมีอัตราการตายแบบเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ ๓ ใน ๑ วัน หรือฟาร์มรายย่อยที่มีจำนวนสุกรหรือหมูป่า น้อยกว่า ๕๐ ตัว มีอัตราการตายเฉียบพลันตั้งแต่ ๑ ตัวขึ้นไป ใน ๑ วัน หรือปรากฏอาการไข้สูง ไอ แท้ง ขาหลังไม่มีแรงหรือนอนสุมกัน ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง หรือขาหลัง

สุกรหรือหมูป่า ในโรงฆ่าสัตว์ที่มีลักษณะการป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง หรือตรวจพบรอยโรคที่ซากสุกร หรือซากหมูป่า ได้แก่ ต่อมน้ำเหลืองโต หรือม้ามโตขยายใหญ่ ๓ - ๖ เท่า หรือมีจุดเลือดออกในอวัยวะต่าง ๆ หรือต่อมน้ำเหลืองมีเลือดออก

ข้อ ๔ เมื่อปรากฏว่ามีสุกรหรือหมูป่าป่วยหรือตายตามข้อ ๓ ให้เจ้าของแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ในพื้นที่ทราบภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสุกรหรือหมูป่าป่วยหรือตาย โดยถือปฏิบัติตามหมวด ๒ ของประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้งและการดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย และการกำหนดชนิด จำนวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์

6.2 การเฝ้าระวังโรคตามแผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ภาวะปกติ

6.2.1 การเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภออื่นๆที่ไม่พบความเสี่ยงสูงมาก (เสี่ยงสูง ปานกลาง ต่ำ)

สถานประกอบการ	เสี่ยงสูง	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงต่ำ
ฟาร์ม	1. เฝ้าระวังทางอาการ 2. หากพบสุกรป่วยตายตามนิยามให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกร จำนวน 15 ตัวอย่าง		
โรงฆ่าสุกร	1. ขอความร่วมมือทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค **2.surface swab 1 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน** 3.เฝ้าระวังทางอาการ 4. โรงฆ่าใดรับสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมาก ให้ **swab** และ**เจาะเลือดสุกร 5 ตัวต่อฟาร์ม** สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า เป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์		
สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร	1.ขอความร่วมมือทำความสะอาดทำลายเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 2. swab ทุก**สัปดาห์** ๆ ละ 5 แห่ง	1.ขอความร่วมมือทำความสะอาดทำลายเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 2. surface swab **เดือน**ละ 10 แห่ง	1.ขอความร่วมมือทำความสะอาดทำลายเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ 2. surface swab **เดือน**ละ 5 แห่ง
สถานที่จำหน่ายอาหารสุกร วัตถุดิบ			

หมายเหตุ : 1. หากพบสุกรป่วยตายตามนิยามให้เก็บเลือดสุกรป่วย จำนวน 15 ตัวอย่างต่อฟาร์ม เก็บกระจายให้ทั่วทั้งฟาร์ม

2. คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอาจเพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

การดำเนินการกรณีพบผลบวกทางห้องปฏิบัติการ ตามแผนเฝ้าระวัง ฯ จำแนกเป็น 3 กรณี

1. กรณีพบ**ผลบวกในฟาร์ม**จากการเก็บตัวอย่าง surface swab ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรป่วย ฟาร์มละ 15 ตัว

1.1. หากพบผลบวกให้ดำเนินการ (1) ทำลายสุกร (2) สอบสวน

1.2 หากพบผลลบก็ให้เฝ้าระวังทางอาการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในช่วงนี้หากพบสุกรแสดงอาการป่วยตายตามนิยามให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกร **จำนวน 15 ตัวอย่างต่อฟาร์ม**

2. กรณีพบ**ผลบวกในโรงฆ่าสัตว์**จากการเก็บตัวอย่าง surface swab ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการฆ่าสุกรและเก็บตัวอย่างเลือดสุกรทุกตัว ที่มีอยู่ในโรงฆ่าในวันที่ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2.1. หากผลตรวจเลือดให้ผลบวก ให้ทำลายสุกรทุกตัวที่ พร้อมจ่ายค่าชดใช้

2.2 หากผลตรวจเลือดให้ผลลบ **อนุญาตให้เข้าฆ่าได้ภายหลัง** (1) มีการทำความสะอาดโรงฆ่า (big cleaning) และ (2) เก็บตัวอย่าง surface swab จำนวน 2 ครั้งในวันที่ 0 และวันที่ 1 และ**ผลตรวจ ให้ผลลบติดต่อกัน 2 ครั้ง**

3. กรณี**พบผลบวก**ที่สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรขอความร่วมมือผู้ประกอบการ**ชะลอ**การขายซากสุกรและ**ทำความสะอาด**ทำลายเชื้อโรคในสถานประกอบการนั้น พร้อมเก็บตัวอย่าง surface swab ใน 3 บริเวณๆ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 0 และวันที่ 1 หลังทำความสะอาดทำลายเชื้อโรค ต้องให้ผลการตรวจเป็นลบทั้งสองครั้ง

เอกสารที่ต้องแนบประกอบการขอเคลื่อนย้ายสุกร



เอกสารแนบ 4

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อฟาร์ม ..... เกษตรกร .....

สถานที่ตั้งฟาร์ม

.....

.....

คะแนนการประเมิน ...../100 คะแนน

มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ .....

วันที่ประเมินผล .....

ลงชื่อ

.....

( )

ผู้รับรองการประเมิน

วันที่ออกรายงาน ( )

หมายเหตุ*

-ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ใช้ได้เฉพาะกับโรคที่กำหนดเท่านั้นและมิได้เป็นหลักฐานรับรองการปลอดจากโรคระบาด

-รายงานฉบับนี้ใช้เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดสัตว์ได้

เอกสารแนบ 5

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)

วันที่ทำแบบประเมิน.....	ชื่อฟาร์ม.....	
ชื่อเกษตรกร.....	ที่อยู่ฟาร์ม	
ชื่อผู้ประเมิน.....	ตำแหน่ง.....	ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

รายการคำถาม

เลือก	คำถาม-ตำตอบ	คะแนนที่ได้
1) ฟาร์มของท่านผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์หรือไม่		
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP ยังไม่หมดอายุ (1)	3.0
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP แล้วแต่หมดอายุ(2)	2.4
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GFM ยังไม่หมดอายุ (3)	1.8
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GFM แล้ว แต่หมดอายุ (4)	1.2
	ยังไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (5)	0.6
2) ลักษณะโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า		
	โรงเรือนปิด แบบอีแวป / แบบอุโมงค์ลม (1)	9.5
	โรงเรือนเปิด มีผนังคอกกันสัตว์ และมีตาข่ายป้องกันนกเข้าโรงเรือนได้ (2)	7.7
	โรงเรือนเปิด มีผนังคอกกันสัตว์ แต่ไม่สามารถป้องกันนกเข้าโรงเรือน (3)	5.6
	โรงเรือนเปิด ไม่สามารถป้องกันสัตว์/นกเข้าโรงเรือน (4)	3.8
	ไม่มีโรงเรือน หรือเลี้ยงปล่อยอิสระ (5)	1.9
3) รั้วรอบฟาร์ม และการแยกพื้นที่เลี้ยงสัตว์และที่พักอาศัย		
	มีการแยกพื้นที่ และมีรั้ว ที่สามารถป้องกันคนและสัตว์อื่นเข้าฟาร์ม (1)	2.5
	มีการแยกพื้นที่ มีรั้ว แต่ไม่สามารถป้องกันสัตว์อื่นเข้าฟาร์มได้ เช่น รั้วลวดหนาม (4)	2.0
	ไม่มีรั้ว และไม่มีการแยกพื้นที่(5)	0.5
4) การจัดการสุกรหรือหมูป่าใหม่ก่อนเข้าฟาร์ม/ฝูง		
	เลี้ยงสุกรหรือหมูป่าแบบall in all out (เข้าหมด ออกหมด) (1)	3.3
	มีโรงเรือนแยก และทำการกักสัตว์ใหม่ อย่างน้อย 14 วัน (2)	2.4
	มีโรงเรือนแยกกักสัตว์ใหม่ แต่กักไม่ถึง 14 วัน (3)	1.6
	ไม่มีโรงเรือนแยกหรือไม่กักสัตว์ใหม่ (5)	0.8

เลือก	คำถาม-ตำตอบ	คะแนนที่ได้
5) มีสัตว์ชนิดอื่นในฟาร์มหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	ไม่มี หรือมี โค / กระบือ / แพะ / แกะ	หากมี สุนัข/แมว 0.4
	สัตว์ปีก	หากไม่มีสุนัข/แมว แต่มีสัตว์ปีก 0.8
	สุนัข / แมว	ไม่มีสัตว์หรือมีเฉพาะ โค / กระบือ / แพะ / แกะ 1.7
6) การปฏิบัติต่อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม		
	ไม่มียานพาหนะภายนอกเข้าบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ โดยใช้รถของฟาร์มภายในฟาร์มเท่านั้น (1)	7.3
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นแต่มีล้างและฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกครั้ง (2)	5.9
	มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะ แต่ไม่ทุกครั้ง (3)	4.4
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นแต่มีการล้างและเชื้อยานพาหนะ แต่ไม่ทุกครั้ง (4)	2.9
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นไม่มีการล้างฆ่าเชื้อ (5)	1.5
7) การปฏิบัติต่อคนก่อนเข้าฟาร์ม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	1 อาบน้ำ	ไม่ทำเลย 1.4
	2 เปลี่ยนชุดก่อนเข้าฟาร์ม	ทำ 1 ข้อ 2.8
	3 เปลี่ยนรองเท้า	ทำ 2 ข้อ 4.2
	4 จุ่มฆ่าเชื้อ รองเท้าก่อนเข้าฟาร์ม	ทำ 3 ข้อ 5.6
	5 ไม่ได้ทำทั้ง 4 ข้อ (เลือกอันนี้ก็เลือกอันอื่นไม่ได้)	ทำ 4 ข้อ 7
8) อาหารที่เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า		
	ให้อาหารสำเร็จรูป /ใช้วัตถุดิบอาหารมาผสมเอง สำหรับสุกรหรือหมูป่าโดยเฉพาะ/ ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหาร เช่น หยวกกล้วย /ให้ผลไม้เป็นอาหาร เช่นกล้วย (1)	13.9
	ให้เศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์และต้มซ้ำจนสุก อย่างน้อย 30 นาทีก่อนให้ (3)	8.3
	ให้เศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์แต่ไม่ต้มซ้ำจนสุกก่อนให้ หรือต้มซ้ำไม่ถึง 30 นาที (5)	2.8
9) ฟาร์มของท่านมีสิ่งต่อไปนี้หรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	1 ซื้อเนื้อหมูจากภายนอกมาประกอบอาหาร หรือบริโภค	ไม่ได้ทำ 8.4
	2 มีน้ำจากครัวเรือนไหลเข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์	เลือก 1 ข้อ 6.7
	3 นำอาหารไปประกอบหรือบริโภคบริเวณเลี้ยงสัตว์	เลือก 2 ข้อ 5.1
	4 ไม่ได้ทำทั้ง 3 ข้อ (เลือกอันนี้ก็เลือกอันอื่นไม่ได้)	เลือก 3 ข้อ 1.7

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
10)	น้ำที่ใช้เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	ใช้คำตอบจากคะแนนที่มากที่สุด
	น้ำประปา / น้ำที่ได้รับการฆ่าเชื้อแล้ว (1)	2.5
	น้ำบาดาล/น้ำฝน (2)	1.5
	น้ำบ่อขุด (3)	1
	น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง น้ำชลประทาน (5)	0.5
11)	การผสมแม่พันธุ์ในฟาร์ม และพ่อพันธ์ หรือ น้ำเชื้อ	
	ไม่มีแม่พันธุ์ (1)	8.1
	ใช้พ่อพันธุ์ภายในฟาร์ม/น้ำเชื้อภายในฟาร์ม ไม่รับจ้างผสม (1)	6.5
	ใช้การผสมเทียม จากแหล่งน้ำเชื้อจากฟาร์มที่มีการตรวจรับรอง (3)	4.9
	ใช้การผสมเทียม จากแหล่งน้ำเชื้อที่ไม่มีการตรวจ (4)	3.2
	ใช้พ่อพันธุ์ที่รับจ้างผสม (ทั้งภายในและภายนอก) (5)	1.6
12)	การกำจัดแมลงและพยาธิภายนอก	
	มีการกำจัดแมลงสม่ำเสมอ / มีการกำจัดพยาธิภายนอกสม่ำเสมอ	0.8
	มีการกำจัดแมลง แต่ไม่สม่ำเสมอ / มีการกำจัดพยาธิภายนอก แต่ไม่สม่ำเสมอ	0.5
	ไม่มีการกำจัดแมลง/ ไม่มีการกำจัดพยาธิภายนอก	0.2
13)	ส่วนใหญ่ แหล่งที่มาของสุกรหรือหมูป่าในฟาร์ม	
	มาจากสุกรหรือหมูป่าภายในฟาร์มเอง หรือในระยะเวลา1ปี ไม่การนำสุกรหรือหมูป่าภายนอกเข้าฟาร์ม (1)	5.7
	มาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม และมีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (2)	4.6
	มาจากฟาร์มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม แต่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (3)	3.4
	มาจากฟาร์มที่รับรองมาตรฐานฟาร์ม แต่ไม่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (4)	2.3
	มาจากฟาร์มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม และไม่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา / ไม่ทราบแหล่งที่มา (5)	1.1
14)	วิธีการขายสุกรหรือหมูป่า	
	มีบริเวณขายสุกรหรือหมูป่าอยู่ภายนอกฟาร์ม (1)	5.5
	ขายสุกรหรือหมูป่าหน้าโรงเรือนโดยเจ้าของฟาร์มจับหรือไล่ออกไปให้ (3)	3.3
	คนภายนอกเข้ามาจับสุกรหรือหมูป่าภายในเล้า (5)	1.1
15)	การจัดการสุกรหรือหมูป่าตาย	
	ฝังหรือเผา ในบริเวณฟาร์ม (1)	3.9
	นำไปชำแหละกินเองภายในฟาร์ม (2)	2.4
	นำไปชำแหละกินเองและแบ่งให้เพื่อนบ้าน หรือ ยกให้คนอื่นไปบริโภค (3)	1.6

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
	ขายให้พ่อค้า (5)	0.8
16)	อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม (กรงหมู อาหาร กระสอบอาหาร)และการฆ่าเชื้อ	
	ใช้เฉพาะภายในฟาร์มไม่ใช้ร่วมกับฟาร์มอื่น (1)	6.3
	ใช้อุปกรณ์ร่วมกับฟาร์มอื่น ล้างและฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าฟาร์ม(3)	3.8
	ใช้อุปกรณ์ร่วมกับฟาร์มอื่น ไม่ล้างและฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าฟาร์ม (5)	1.3
17)	ระดับความเสี่ยงของอำเภอที่ฟาร์มตั้งอยู่ (อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการปะเมินความเสี่ยง)	
	เสี่ยงสูงมาก 5	2.6
	เสี่ยงสูง 4	5.2
	เสี่ยงปานกลาง 2	10.4
	เสี่ยงต่ำ 1	13

รวมคะแนนเท่ากับ ...../100 คะแนน ระดับความเสี่ยง .....

วิธีคำนวณคะแนนและการประเมินความเสี่ยง

1. รวมคะแนนจากข้อ 1) - 17) จากคำตอบที่ได้จากเกษตรกร
2. เศษทศนิยมให้ปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม
3. การแปลผลระดับความเสี่ยง

ก.	มากกว่าหรือเท่ากับ 80	คะแนน	เป็น	เสี่ยงต่ำมาก
ข.	60 – 79	คะแนน	เป็น	เสี่ยงต่ำ
ค.	40 – 59	คะแนน	เป็น	เสี่ยงปานกลาง
ง.	20 – 39	คะแนน	เป็น	เสี่ยงสูง
จ.	น้อยกว่า 20	คะแนน	เป็น	เสี่ยงสูงมาก

เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด

ระดับความเสี่ยงอำเภอต้นทาง	เกณฑ์การพิจารณาอนุญาต			
	compartment	ASF free Farm	GAP	Non GAP
สูงมาก	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB 3.คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ผล LAB มีอายุ 7 วัน 3.คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ผล LAB มีอายุ 3 วัน 3.คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
สูง	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB 3.คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ผล LAB มีอายุ 7 วัน 3.คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ปานกลาง	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB 3.คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ต่ำ	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB	1.ไม่พบอัตราการป่วยและตายผิดปกติ 2.ไม่ต้องใช้ผล LAB

หมายเหตุ :
1. หากไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการประเมินความเสี่นงระดับจังหวัด อนุญาตเคลื่อนย้ายได้ภายในจังหวัดเท่านั้น
2. คะแนนประเมินความเสี่ยงใช้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่ทำการประเมิน
3. อัตราการป่วยและตายตามนิยามโรค ASF (case fatality) ตะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ภายใน 30 วัน
4. อายุผล LAB เริ่มนับหลังวันที่ห้องปฏิบัติการตอบผล

อายุผลการตรวจโรค ASF เพื่อประกอบการเคลื่อนย้าย

ระดับความเสี่ยง/ ประเภทฟาร์ม	non-GAP	GAP	ฟาร์มปลอดโรค ASF	คอมพาร์ทเมนต์ ASF
เสี่ยงสูงมาก	3	7	1 ปี	3 ปี
เสี่ยงสูง	7	ไม่ต้องใช้ผลแลป	ไม่ต้องใช้ผลแลป	ไม่ต้องใช้ผลแลป
เสี่ยงปานกลาง	ไม่ต้องใช้ผลการตรวจโรคประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย			
เสี่ยงต่ำ	ไม่ต้องใช้ผลการตรวจโรคประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย			

การเคลื่อนย้ายสุกร

1. เพื่อเข้าโรงฆ่าสุกร

สัตวแพทย์ประจำพื้นที่หรือประจำเขตพื้นที่ต้นทาง

ตรวจสอบระดับความเสี่ยงของต้นทาง ตามประกาศของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ดังนี้

ฟาร์มต้นทาง

- ฟาร์มต้นทางต้องเป็นฟาร์มที่ไม่พบอาการตามนิยาม หรือมีอัตราการป่วยตาย (case fatality) เกินร้อยละ 50 ภายใน 3 วัน
- ฟาร์มที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมี 1 กม.รอบฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก เคลื่อนย้ายได้หลังทำลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากไปแล้ว 14 วันขึ้นไป แต่ถ้าจะเคลื่อนย้าย ต้องเก็บตัวอย่างสุกรโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้าย โรงเรือนละ 15 ตัว ผลต้องเป็นลบ

โรงฆ่าปลายทาง

- กรณีรับสุกรจากฟาร์มในอำเภอเสี่ยงสูงมากมาเข้าฆ่า ให้เก็บตัวอย่างเลือดฟาร์มนั้นๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 ตัวขึ้นไป
- กรณีรับจากฟาร์มในหลายๆอำเภอ รวมพื้นที่เสี่ยงสูงมากมาเข้าฆ่า ให้ surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กรณีการเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อเข้าโรงฆ่าสุกร

ระดับความเสี่ยง	ต้นทาง	การดำเนินการที่โรงฆ่าปลายทางกรณีรับสุกรจากพื้นที่เสี่ยงสูงมาก
สูงมาก	1. ห้ามเคลื่อนย้าย หรือ 2. หากจะเคลื่อนย้ายจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน	1. surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า เป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 2. เจาะเลือดสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมาก จำนวน 5 ตัว ต่อฟาร์ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สูง	1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 2. หากเป็นฟาร์ม non - GAP จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน	
ปานกลาง	1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป ไม่ต้องประเมินความเสี่ยง 2. ฟาร์ม GFM ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 3. หากต่ำกว่าฟาร์ม GFM จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน	
ต่ำ	1. ฟาร์มทุกประเภท และไม่ต้องประเมินความเสี่ยง	

หมายเหตุ : 1. ฟาร์มที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรอนุญาตได้ภายหลังมีการ**ทำลายสุกรในฟาร์ม**ที่พบความเสี่ยง**สูงมาก**ไปแล้ว**ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ แต่ถ้าจะเคลื่อนย้ายต้อง**เก็บตัวอย่างเลือดสุกรโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้าย**โรงเรือนละ 15 ตัว** ผลการตรวจต้องให้ผลลบ

2. ต้องเป็นฟาร์มที่ไม่พบอาการตามนิยาม หรือมีอัตราการป่วยตาย (case fatality) เกินร้อยละ 50 ภายใน 3 วัน

3. อายุผล LAB ขึ้นกับระดับความเสี่ยง และ ประเภทฟาร์ม

4. กรณีโรงฆ่ารับสุกรจากหลายพื้นที่ความเสี่ยงให้ดำเนินการจากระดับความเสี่ยงของฟาร์มต้นทางที่สูงที่สุด **(เสี่ยงสูงมาก)**

ตัวอย่างการเคลื่อนย้ายสุกรขุนเข้าโรงฆ่า

ต้นทาง	ระดับความเสี่ยง	หลักเกณฑ์	ปลายทาง	ระดับความเสี่ยง	หลักเกณฑ์
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	สูงมาก	1. ถ้าฟาร์มเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาร์มที่เกิดโรคหรืออยู่ในรัศมี 1 กม. ต้องทำลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ (แต่ถ้าจะเคลื่อนย้ายต้องเก็บตัวอย่างเลือดสุกรโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้ายโรงเรือนละ 15 ตัว ผลการตรวจต้องให้ผลลบ) 2. เป็นฟาร์ม GAP หรือ non-GAP พร้อมใบประเมิน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 3. อัตราป่วยและตาย ไม่เกิน 50 % ภายใน 3 วัน 4. เจาะเลือดตรวจ ASF 4.1 ฟาร์มเลี้ยงไม่เกิน 500 ตัว เจาะ 15 ตัว/ฟาร์ม 4.2 ฟาร์มเลี้ยงเกิน 500 ตัว เจาะโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้าย 15 ตัว/โรงเรือน 5. อายุผลแลป 5.1 GAP มีอายุ 7 วัน นับจากหลังวันตอบผล 5.2 non-GAP มีอายุ 3 วัน นับจากหลังวันตอบผล	อ.เมือง จ.นครปฐม	สูง	1. surface swab สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะไม่มีสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมากเข้าฆ่า เป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 2. เจาะเลือดสุกรจากอำเภอเสี่ยงสูงมาก จำนวน 5 ตัวต่อฟาร์ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี	สูง	1. เป็นฟาร์ม GAP หรือ non – GAP พร้อมใบประเมินได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 2. เจาะเลือดตรวจ ASF 3. อายุผลแลป 3.1 GAP ไม่ต้องใช้ผลแลป 3.2 non-GAP มีอายุ 7 วัน นับจากหลังวันตอบผล	อ.เมือง จ.นครปฐม	สูงมาก	



รายงานการเคลื่อนย้ายสุกรจากพื้นที่ อำเภอเสี่ยงสูงมากเข้ามาในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ระหว่างวันที่ 17 - 23 พ.ค. 64

ลำดับ	อำเภอ - จังหวัดต้นทาง	อำเภอ - จังหวัดปลายทาง	เข้าโรงฆ่า		นำไปเลี้ยง		นำไปจำหน่าย		รวม	
			ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว
1	อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี	อ.เมือง จ.นครปฐม	8	572	-	-	-	-	8	572
2	อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	5	500	-	-	-	-	5	500
3	อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี	อ.เมือง จ.นครปฐม	1	60	-	-	-	-	1	60
4	อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000
5	อ.เมือง จ.นครปฐม	อ.เมือง จ.นครปฐม	144	4,236	-	-	1	40	145	4,276
6		อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	12	180	-	-	-	-	12	180
7		อ.ดอนตูม จ.นครปฐม	13	1,036	-	-	-	-	13	1,036
8		อ.สามพราน จ.นครปฐม	4	340	-	-	-	-	4	340
9		อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	1	12	1	520	-	-	2	532
10	อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	-	-	3	4	-	-	3	4
11		อ.เมือง จ.นครปฐม	12	1,200	-	-	-	-	12	1,200
12	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	อ.เมือง จ.นครปฐม	3	120	-	-	4	640	7	760
13	อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	อ.เมือง จ.นครปฐม	1	150	-	-	-	-	1	150
14		อ.บางเลน จ.นครปฐม	4	474	-	-	-	-	4	474
15	อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	-	-	3	425	-	-	3	425
16	อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	3	45	-	-	-	-	3	45
17		อ.เมือง จ.นครปฐม	3	340	-	-	-	-	3	340
18	อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	อ.ดอนตูม จ.นครปฐม	3	270	-	-	-	-	3	270
19	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	-	-	2	1,010	-	-	2	1,010
20	อ.เมือง จ.พัทลุง	อ.เมือง จ.นครปฐม	1	40	-	-	-	-	1	40
21	อ.เมือง จ.พิษณุโลก	อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	-	-	3	96	-	-	3	96
22		อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	-	-	3	70	-	-	3	70

ลำดับ	อำเภอ - จังหวัดต้นทาง	อำเภอ - จังหวัดปลายทาง	เข้าโรงฆ่า		นำไปเลี้ยง		นำไปจำหน่าย		รวม	
			ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว
23	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	อ.เมือง จ.นครปฐม	3	390	-	-	-	-	3	390
24	อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	1	3	3	570	-	-	4	573
25		อ.เมือง จ.เพชรบุรี	2	5	-	-	-	-	2	5
26		อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	1	20	-	-	-	-	1	20
27		อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	1	6	-	-	-	-	1	6
28		อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์	1	6	-	-	-	-	1	6
29		อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	-	-	1	500	-	-	1	500
30		อ.เมือง จ.นครปฐม	1	100	-	-	-	-	1	100
31	อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	5	10	-	-	-	-	5	10
32		อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	15	130	-	-	-	-	15	130
33		อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	6	75	-	-	-	-	6	75
34		อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	2	4	-	-	-	-	2	4
35		อ.เมือง จ.เพชรบุรี	10	94	-	-	-	-	10	94
36		อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1	70	-	-	-	-	1	70
37		อ.เมือง จ.นครปฐม	7	700	-	-	-	-	7	700
38		อ.ดอนตูม จ.นครปฐม	2	200	-	-	-	-	2	200
39	อ.เมือง จ.ราชบุรี	อ.สามพราน จ.นครปฐม	36	2,526	-	-	-	-	36	2,526
40		อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	1	12	-	-	-	-	1	12
41		อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	4	140	1	250	-	-	5	390
42		อ.เมือง จ.นครปฐม	80	7,575	-	-	-	-	80	7,575
43		อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	2	115	-	-	-	-	2	115
44		อ.ดอนตูม จ.นครปฐม	3	300	-	-	-	-	3	300

ลำดับ	อำเภอ - จังหวัดต้นทาง	อำเภอ - จังหวัดปลายทาง	เข้าโรงฆ่า		นำไปเลี้ยง		นำไปจำหน่าย		รวม	
			ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว	ครั้ง	ตัว
45	อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	อ.เมือง จ.นครปฐม	5	315	-	-	-	-	5	315
46		อ.สามพราน จ.นครปฐม	1	80	-	-	-	-	1	80
47	อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	อ.เมือง จ.นครปฐม	12	1,030	-	-	-	-	12	1,030
48		อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	3	150	-	-	-	-	3	150
49		อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	1	10	-	-	-	-	1	10
50	อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	อ.สามพราน จ.นครปฐม	18	1,775	-	-	-	-	18	1,775
51		อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	5	130	1	250	-	-	6	380
52		อ.เมือง จ.นครปฐม	66	3,827	-	-	-	-	66	3,827
53		อ.ดอนตูม จ.นครปฐม	5	500	-	-	-	-	5	500
54		อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	15	1,100	-	-	-	-	15	1,100
55		อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	-	-	5	245	-	-	5	245
56		อ.บางเลน จ.นครปฐม	4	420	-	-	-	-	4	420
57		อ.เมือง จ.ราชบุรี	-	-	2	500	-	-	2	500
58	อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	อ.เมือง จ.นครปฐม	1	100	-	-	-	-	1	100
59	อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี	อ.เมือง จ.นครปฐม	19	1,810	-	-	-	-	19	1,810
60		อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	6	600	-	-	-	-	6	600
61		อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี	-	-	2	500	-	-	2	500
62		อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	1	90	-	-	-	-	1	90
63		อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี	-	-	2	736	-	-	2	736
64	อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	อ.ดอนตูม จ.นครปฐม	4	400	-	-	-	-	4	400
65	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	อ.บางเลน จ.นครปฐม	11	1,100	-	-	-	-	11	1,100
66		อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	-	-	2	760	-	-	2	760


2. เพื่อนำไปเลี้ยง
สัตวแพทย์ประจำฟาร์มหรือ
ประจำเขตพื้นที่ต้นทาง
ตรวจสอบระดับความเสี่ยงของต้นทาง
ตามประกาศของคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้
ฟาร์มต้นทางที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือฟาร์มที่อยู่ในรัศมี 1 กม. เคลื่อนย้ายได้ภายหลัง
ทำลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน
แต่หากต้องการเคลื่อนย้ายให้เก็บเลือดตรวจASF ผลต้องเป็นลบ
- จำนวนสุกรที่จะเคลื่อนย้าย ≤ 100 ตัว : เก็บ 50%ของจำนวนที่จะเคลื่อนย้าย
- จำนวนสุกรที่จะเคลื่อนย้าย > 100 ตัว : เก็บเลือดสุกรจะเคลื่อนย้าย 60 ตัว

กรณีการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปเลี้ยง

ระดับความเสี่ยง (ต้นทาง)	หลักเกณฑ์ฟาร์ม (ต้นทาง)	ระดับความเสี่ยง (ปลายทาง)	หลักเกณฑ์ฟาร์ม (ปลายทาง)
สูงมาก	1. ห้ามเคลื่อนย้าย หรือ 2. หากจะเคลื่อนย้ายจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน	สูงมาก →	1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป ** 2. ถ้าไม่ใช่ GAP ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 80 และต้องไม่อยู่ในรัศมี 3 กม.รอบฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก 3. หากปลายทางเป็นฟาร์มที่เสี่ยงสูงมากต้องทำลายสุกร มาแล้วไม่น้อยกว่า **3 เดือน** และก่อนลงเลี้ยง swab โรงเรือน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ เช่น ในวันที่ 14 และ 21
สูง	1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 2. หากเป็นฟาร์ม non - GAP จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน	สูง →	1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป ** 2. ถ้าไม่ใช่ GAP ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 และก่อนลงเลี้ยงให้ swab โรงเรือน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ เช่น ในวันที่ 14 และ 21
ปานกลาง	1. ฟาร์ม GAP ขึ้นไป ไม่ต้องประเมินความเสี่ยง 2. ฟาร์ม GFM ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 3. หากต่ำกว่าฟาร์ม GFM จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน	ปานกลาง	1. ฟาร์ม GFM ขึ้นไป 2. ไม่ต้องเก็บตัวอย่างเลือดทั้งก่อนลงเลี้ยง และหลังลงเลี้ยง
ต่ำ	1. ฟาร์มทุกประเภทและไม่ต้องประเมินความเสี่ยง	ต่ำ	

หมายเหตุ : 1. ฟาร์มต้นทางเป็นฟาร์มที่**เชื่อมโยงโดยตรง**หรือ**ฟาร์มที่อยู่ในรัศมีควบคุมความเสี่ยง 1 กิโลเมตร** ให้พิจารณาอนุญาตได้ภายหลังมีการทำลายสุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมากไปแล้ว**ไม่น้อยกว่า 1 เดือน** แต่หากต้องการจะเคลื่อนย้ายจะต้องเก็บตัวอย่างเลือดสุกรชุดที่จะเคลื่อนย้าย (1) สุกรไม่เกิน 100 ตัว เก็บเลือด ร้อยละ 50 (2) สุกรมากกว่า 100 ตัว เก็บเลือด 60 ตัว

2. ฟาร์มปลายทาง**ทุกระดับ**ความเสี่ยง หากรับสุกรจากฟาร์มในพื้นที่เสี่ยง**สูงมาก**เข้ามาเลี้ยงจะต้องเก็บตัวอย่างสุกรชุดที่เคลื่อนย้ายมาเลี้ยง จำนวน 15 ตัวอย่างต่อโรงเรือน ในวันที่ 1 และวันที่ 7 หลังลงเลี้ยง

**** เพิ่มเติมตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว11910 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2564 เรื่อง การผ่อนปรนการขออนุญาตนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ในพื้นที่อำเภอปลายทางที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมาก**

ตัวอย่างการเคลื่อนย้ายลูกสุกรไปเลี้ยง

ต้นทาง	ระดับความเสี่ยง	หลักเกณฑ์	ปลายทาง	ระดับความเสี่ยง	หลักเกณฑ์
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	สูงมาก	1. ถ้าฟาร์มเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาร์มที่เกิดโรค หรืออยู่ในรัศมี 1 กม. จะต้องทำลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายด่วนจะต้องเก็บตัวอย่างมากกว่าปกติ) 2. เป็นฟาร์ม GAP หรือ non-GAP และได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 3. อัตราป่วยและตาย ไม่เกิน 50 % ภายใน 3 วัน 4. เจาะเลือดตรวจ ASF 4.1 ฟาร์มเลี้ยงไม่เกิน 500 ตัว เจาะ 15 ตัว/ฟาร์ม 4.2 ฟาร์มเลี้ยงเกิน 500 ตัว เจาะโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้าย 15 ตัว/โรงเรือน 5. อายุผลแลป 5.1 GAP มีอายุ 7 วัน นับจากหลังวันตอบผล 5.2 non-GAP มีอายุ 3 วัน นับจากหลังวันตอบผล	1. ฟาร์ม A อ.สองพี่น้อง จ.กาญจนบุรี (เกิดโรค) 2. ฟาร์ม B อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 3. ฟาร์ม C อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี	สูงมาก สูงมาก สูง	1. ต้องทำลายสุกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 2. ฟาร์ม GAP หรือถ้าไม่ใช่ GAP ต้องมีใบประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 3. ก่อนลงเลี้ยง swab โรงเรือน ที่จะลงเลี้ยง 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ เช่น ในวันที่ 14 และ 21 (ให้ผลลบ ทั้ง 2 ครั้ง) 4. เจาะเลือดสุกรหลังลงเลี้ยง 15 ตัว ในวันที่ 1 และ 7 1. ฟาร์ม GAP 2. ถ้าไม่ใช่ GAP ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และต้องไม่อยู่ในรัศมี 3 กม.รอบฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูงมาก และก่อนลงเลี้ยง swab โรงเรือน 2 ครั้ง 3. เจาะเลือดสุกรหลังลงเลี้ยง 15 ตัว ในวันที่ 1 และ 7 1. ฟาร์ม GAP 2. ถ้าไม่ใช่ GAP ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และก่อนลงเลี้ยง swab โรงเรือน 2 ครั้ง 3. เจาะเลือดสุกรหลังลงเลี้ยง 15 ตัว ในวันที่ 1 และ 7


3.เคลื่อนย้ายโดยผ่านคอกขายกลาง
สัตวแพทย์ประจำพื้นที่หรือประจำเขตพื้นที่ต้นทาง
สัตวแพทย์พื้นที่ที่คอกขายกลางตั้งอยู่
สัตวแพทย์พื้นที่ปลายทาง
1.ออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
2.ตรวจสอบประเภทของสุกรที่จะเคลื่อนย้ายให้สอดคล้องกับสถานประกอบการปลายทางสุดท้าย
3.แจ้งหมายเลขทะเบียนรถที่จะมารับสุกรต่อจากคอกขายกลางและสถานประกอบการปลายทางสุดท้ายเป็นลายลักษณ์อักษร
1.ตรวจสอบและกำกับให้ผู้ประกอบการนำสุกรลงที่คอกขายกลางครั้งละ 1 ฟาร์มเท่านั้น
2.รีบย้ายสุกรไปยังสถานประกอบการปลายทางภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่สุกรตัวสุดท้ายของฟาร์มนั้นๆลงที่คอกขายกลาง (All in All out)
3.ให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคคอกขายกลางพักไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนที่จะอนุญาตให้สุกร ฟาร์มถัดไปลงมาที่คอกขายกลาง
4.ออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายไปยังสถานประกอบการปลายทางสุดท้ายให้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถและสถานประกอบการปลายทางสุดท้ายต้อง ตรงกับที่สัตวแพทย์พื้นที่ต้นทางที่ฟาร์มตั้งอยู่แจ้งมา
1.ตรวจโรคระบาดและตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และเก็บใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
2. บันทึกรายการตอบรับสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด
3.หากตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ป่วยหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้แจ้ง ปศจ.และ ปศข. ทั้งต้นทางและปลายทางโดยด่วน
4.หากไม่พบสัตว์เคลื่อนย้ายเข้ามา จนเวลาล่วงเข้าไปในวันถัดไปอีกวันหนึ่ง ให้สอบสวน หากพบกระทำผิดให้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อ พนง.สอบสวนและรายงานผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน

เกณฑ์ในการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเพื่อประกอบการเคลื่อนย้าย

1. ฟาร์มที่มีจำนวนสุกร ไม่เกิน 500 ตัว เจาะเลือดสุกรฟาร์มละ 15 ตัว

2. ฟาร์มที่มีจำนวนสุกร มากกว่า 500 ตัว ให้เจาะเลือดสุกรเฉพาะโรงเรือนที่จะเคลื่อนย้ายโรงเรือนละ 15 ตัว

3. ให้เจาะเลือดสุกรที่แสดงอาการผิดปกติหรือแสดงอาการตามนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

4. ต้องสอดคล้องกับประเภทของสุกรที่จะเคลื่อนย้าย ดังนี้

    4.1 การเคลื่อนย้ายลูกสุกรหย่านมให้เก็บตัวอย่างจากแม่พันธุ์ชุดที่จะขออนุญาตเคลื่อนย้าย

    4.2 การเคลื่อนย้ายสุกรขุนให้เก็บตัวอย่างเลือดจากสุกรขุนชุดที่จะเคลื่อนย้าย

    4.3 การเคลื่อนย้ายพ่อ-แม่พันธุ์ทดแทนให้เก็บตัวอย่างชุดที่จะเคลื่อนย้าย

    4.4 การเคลื่อนย้ายพ่อ-แม่พันธุ์ปลดให้เก็บตัวอย่างชุดที่จะเคลื่อนย้าย

หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม

- การควบคุมการเก็บตัวอย่างและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร
- ขณะเก็บตัวอย่าง ต้องแสดงให้เห็นว่าเก็บตัวอย่างในฟาร์มนั้นๆ จริงๆ
- ขณะเคลื่อนย้ายสุกร ต้องเคลื่อนย้ายเฉพาะโรงเรือนที่เก็บตัวอย่าง สุขภาพของสุกรโดยรวมๆ ขั้นตอนการขนสุกรจากโรงเรือนขึ้นรถจับหมู เลขทะเบียนรถบรรทุกสุกร
- ฟาร์มที่มีจำนวนสุกรมากกว่า 500 ตัว ใช้โปรแกรม Zoom + บันทึกภาพเคลื่อนไหว
- ฟาร์มที่มีสุกรน้อยกว่า 500 ตัว ใช้โปรแกรม Zoom + VDO call

หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม

- การเคลื่อนย้ายสุกรภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7
- เมื่อผ่านด่านต้องพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกสุกร ทุกด่าน
- เมื่อนำสุกรลงที่ปลายทางเรียบร้อยแล้ว ต้องพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง
- ด่านจะออกใบรับรองการพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทุกครั้ง
- ผู้ประกอบการต้องนำใบพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไปแสดงกับสัตวแพทย์ต้นทางเพื่อขออนุญาตเคลื่อนย้ายในครั้งถัดไป

หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม และ หนังสือที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2564

- การเคลื่อนย้ายสุกรแม่พันธุ์ปลดทิ้งและสุกรขุน จากเขตอื่นเข้าเขต 5 เพื่อเข้าโรงฆ่า หรือส่งออกต่างประเทศ

เดิม ; มีการเปลี่ยนถ่ายสุกร ก่อนเข้าพื้นที่เขต 5 (ทอยสุกร เปลี่ยนรถจับหมูคันใหม่ เป็นรถที่ใช้ภายในเขต 5) ณ จุดเปลี่ยนถ่าย(ทอย)สุกร ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ใหม่ ; 1) จะมีการทอยสุกร เหมือนเดิมก็ได้ หรือ

2) ไม่ต้องทอย ใช้รถคันเดิมได้ และต้องพ่นยาฆ่าเชื้อเมื่อผ่านด่านทุกด่าน รวมทั้งเมื่อเอาหมูลงเรียบร้อยแล้ว ต้องพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง ด่านจะออกใบรับรองการพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทุกครั้ง โดยผู้ประกอบการต้องนำใบพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไปแสดงกับสัตวแพทย์ต้นทางเพื่อออกใบเคลื่อนย้ายในครั้งถัดไป

จุดขนส่งเปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิตที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเพื่อ
เคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าหรือผ่านจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
น่าน
ถนนหมายเลข
11
ถนนหมายเลข
1045
อุตรดิตถ์
บัลลังค์ฟาร์ม
บุญมีฟาร์ม
ประสิทธิ์ฟาร์ม
ถนนหมายเลข
1106
สมคิดเกษตรฟาร์ม
บ้านชัยมงคล
ขทัย
พิษณุโลก
N
O
E
S
จัดทำโดย : สนง.ปศข.7 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 64

หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม

- การเคลื่อนย้ายสุกรระหว่างพื้นที่ปศุสัตว์เขต (เช่น จาก เขต 8 ไปยังเขต 7)
- ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อเมื่อผ่านด่านทุกด่าน
- รวมทั้งเมื่อเอาหมูลงเรียบร้อยแล้ว ต้องพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง
- ด่านจะออกใบรับรองการพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทุกครั้ง โดยผู้ประกอบการต้องนำใบพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไปแสดงกับสัตวแพทย์ต้นทางเพื่อ ออกใบอนุญาตในครั้งถัดไป

หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม

- การส่งสุกรไปต่างประเทศยังคงปฏิบัติตาม หนังสือที่ กษ 0621/ว37038 ลงวันที่ 30 ต.ค. 63 ร่วมกับหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว8943 ลงวันที่ 24 มี.ค. 64 คือ
- ตาม หนังสือที่ กษ 0621/ว37038 ลงวันที่ 30 ต.ค. 63 ต้อง มี

(1) สำเนา GAP

(2) สำเนา หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน (ต.ร.4)

(3) ผลตรวจ ASF , Brucellosis , Leptospirosis , Beta-agonist (ผล lab ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 1 เดือน, เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 5 ตัว หรือ 5 % ของจำนวนสุกรที่เคลื่อนย้าย(คัน/เที่ยว)

(4)ใบรับรองการฉีดวัคซีนFMD และ PRRS (ตัวจริง)

(5)สำเนา ร.10

(6) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย + เอกสารตามข้อ (1) ถึง (5)

ขั้นตอนการส่งออกสุกร

e-Movement
ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Movement)

ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรส่งออก
ยื่นใบคำร้องขอใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
สัตว์ซากสัตว์ ผ่านระบบการเคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Movement) ณ ด่านกักกันสัตว์ ท่าออก
- แบบคำขอ ร.1/1
- ใบอนุญาต ร.9
- Health Certicate

01 ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรส่งออก

PIG FARM DLD 2020

ฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

1. หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน(ต.ร.4) (สำเนา)
2. ฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) (สำเนา)
3. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB (ต้องเป็นของกรมปศุสัตว์เท่านั้น) (ตัวจริง)
   - ASF
   - Beta-agonist
   - Brucellosis, Leptospirosis
4. เอกสารการฉีดวัคซีน (ตัวจริง)
   - Vaccine PRRS
   - Vaccine FMD
5. ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ (ร.10) (สำเนา)
6. ร.3 หรือ ร.4 หรือ ร.5 (ให้แนบเอกสารตามข้อ 1-5 มาพร้อมกับใบอนุญาต)

** การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB ให้เก็บอย่างน้อย 5 ตัวอย่าง หรือ 5% ของจำนวนสุกรในการส่งออกแต่ละครั้งโดยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB ไม่เกิน 1 เดือน

02 รถบรรทุกสุกร

ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรส่งออก ได้รับใบอนุญาต
- ได้รับใบอนุญาต ร.9
- Health Certicate

03 จุดขนถ่ายสุกรเพื่อการส่งออก

ผู้ประกอบการฟาร์สุกรส่งออก ได้รับใบอนุญาต
บรรทุกสุกร ไปยังจุดขนถ่ายสุกร
- ได้รับใบอนุญาต ร.9
- Health Certicate

หมายเหตุ สุกรที่ส่งออกและเคลื่อนย้ายผ่านเขต 2 จะต้องดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ.2558

หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรค ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพิ่มเติม

- ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.07/ ว8943 ลงวันที่ 24 มี.ค. 64 ต้องพิจารณา

(1) ระดับความเสี่ยงต่อโรค ASF ของอำเภอต้นทางที่ฟาร์มตั้งอยู่

(2) ถ้าฟาร์มตั้งอยู่ในอำเภอเสี่ยงสูงมาก ผลตรวจ ASF จะมีอายุ 7 วัน (ส่วนความเสี่ยงระดับอื่นๆ ผลตรวจ ASF จะมีอายุ 1 เดือน

(3) หากอยู่ในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูง สุกรในฟาร์มที่พบความเสี่ยงสูง จะต้องทำลายสุกรมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน (กรณีนำไปเลี้ยง) และ ไม่น้อยกว่า 14 วัน (กรณีนำไปเข้าโรงฆ่า)

(4) กรณีอำเภอต้นทางเสี่ยงสูงมาก ฟาร์มสุกรต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกร ต่อโรค ASF ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และเสี่ยงสูง ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

มาตรการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1. ตรวจสอบปลายทางให้สอดคล้องกับประเภทของสุกร เช่น แม่ปลดทิ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าโรงฆ่า เพราะฉะนั้นปลายทางต้องเป็นโรงฆ่า

2. สัตวแพทย์ต้นทางบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในผลตรวจโรค ASF โดยระบุข้อความว่า**ใบรายงานผล**ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเลขที่ใดและอายุผล LAB ต้องสอดคล้องตามระดับความเสี่ยงของต้นทาง

3. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้นำยานพาหนะบรรทุกไปรับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ด่านกักสัตว์ในพื้นที่พร้อมออกหลักฐานรับรองการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกเคลื่อนย้ายของสัตวแพทย์พื้นที่ต้นทางในครั้งถัดไป

4. การขอเคลื่อนย้ายซากสุกรเข้าเขตโรคระบาด เขตโรคระบาดชั่วคราวหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดให้สัตวแพทย์พื้นที่ต้นทางทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุญาตเข้าไปยังพื้นที่ปลายทาง และต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสัตวแพทย์พื้นที่ปลายทางจึงสามารถออกหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการได้

5. ภายหลังได้รับหนังสือแล้วสัตว์แพทย์ปลายทางต้องตอบกลับภายในไม่เกิน 1 วัน หากไม่อนุญาตให้ทำหนังสือไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลและความจำเป็นประกอบการชี้แจงแก่สัตวแพทย์พื้นที่ต้นทาง

6. กรณีฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ ที่ได้รับรอง ระบบ ePP ผู้ประกอบการต้องแสดงแผนการเคลื่อนย้ายซากสุกร ล่วงหน้าและให้ระบุสถานประกอบการปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายซากไป รวมถึงจำนวนสัตว์ที่ไม่เกินแผนที่ได้แสดงล่วงหน้าไว้แก่สัตว์แพทย์ปลายทาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๑
ที่ กษ.๐๖๑๐.๐๗/ ๑๐๖๔ **วันที่** ๕ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่ามีชีวิตจากนอกพื้นที่ เพื่อเข้าเลี้ยงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

1. ต้นทางต้องเป็นฟาร์ม GAP หรือสูงกว่าเท่านั้น และ ต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสีแดง
2. เจาะเลือดหรือน้ำลายสุกรชุดที่จะเคลื่อนย้ายชุดละ 60 ตัว ผลแลป มีอายุ 3 วัน
3. ฟาร์มปลายทางต้อง

3.1 เป็นฟาร์ม GAP หรือสูงกว่าหรือตามที่คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดเห็นสมควร

3.2 ต้องมีคอกกักสุกรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่

3.3 กักสุกรไว้อย่างน้อย 14 วัน

3.4 เก็บเลือดหรือน้ำลายสุกรชุดที่เคลื่อนย้ายใหม่ชุดละ 60 ตัว จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และวันที่ 7 หลังเข้ามากัก

สรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการในการเฝ้าระวังโรคระบาดที่สำคัญในสุกร



เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสุกรหรือซากสุกรไปยังท้องที่จังหวัด

1. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย (ร.3/ร.4/ร.5)
2. ใบค้าสัตว์ (ร.10) หรือใบค้าซากสัตว์ (ร.10/1)
3. หนังสืออนุญาตปลายทาง (กรณีย้ายเข้าเขตโรคระบาด/ชั่วคราว/เฝ้าระวังโรค)
4. ใบรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง (กรณีย้ายเข้าโรงฆ่าสุกร)
5. ใบรับรอง GAP /GFM/ฟาร์มปลอดโรค FMD /ASF
6. ผลตรวจ ASF (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของต้นทางและประเภทฟาร์ม GAP/non GAP)
7. ใบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง มีอายุ 7 วัน
8. ผลตรวจ surface swab โรงเรือน ก่อนนำสุกรลงเลี้ยง 14 วัน ต้องให้ผลลบ ต่อ ASF
9. รายงานสุกรป่วยแล้วตาย
10. ใบ สพส.1 (กรณีเข้า โรงฆ่า EST)

ภาพ Info และขั้นตอนการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรค ASF

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม (ส่วนสุขภาพสัตว์) โทร ๐-๓๔๒๕-๐๙๘๒
ที่ กษ ๐๖๑๖/ ๑๐๐๗๐ **วันที่** ๐๖ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งภาพ Info graphic และ Power point แนวทางการเฝ้าระวังและเคลื่อนย้ายสุกร

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ขอส่งภาพ Info graphic และ Power point แนวทางการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า ซึ่งสรุปตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๗/๖๘๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดสามารถสแกนได้จาก QR Code ด้านท้าย หรือ ดาวน์โหลด ได้จากหน้าเวปไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ หรือดาวน์โหลดได้จาก E-Mail ของหน่วยงานของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจำลอง วรศรี)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต ๗

Info การเตรียมความพร้อม ASF

วิธีเก็บตัวอย่างและมาตรการ 64

การดำเนินการตามแผนฯ ASF

.ptt การเฝ้าระวังโรค.เคลื่อนย้าย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม (ส่วนสุขภาพสัตว์) โทร ๐-๓๔๒๕-๐๙๘๒
ที่ กษ ๐๖๑๖/ ๑๒๕๕๓ **วันที่** ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)"

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ขอส่งขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever ; ASF)" ซึ่งสรุปรวบรวมจากองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชุมพล บุญรอด)
ปศุสัตว์เขต ๗

ขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน (SOP)

ขอบคุณครับ