



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 Office of Regional Livestock 7

องค์กรที่เป็นเลิศ เป็นมืออาชีพด้านการปศุสัตว์ เป็นที่พึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์



ปศุสัตว์เขต ๗ ร่วมประชุมการเฝ้าระวังป้องกันโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗ มอบให้นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมประชุมการเฝ้าระวังป้องกันโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยมีนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน สรุปการประชุม ได้ดังนี้

๑. การเฝ้าระวังโรค

- ๑.๑ ปรับนิยามโรค ASF (ตามภาพ)
- ๑.๒ แนวทางการเฝ้าระวังโรค ASF (ตามภาพ)

๒. ระบบ คอมพิวเตอร์เมนู โรค ASF (ตามภาพ)

๓. การควบคุมการเคลื่อนย้าย จะกำหนดระดับความเสี่ยงต่อโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรในทุกพื้นที่ของประเทศไทย กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร โดยมีการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการประกอบการพิจารณาการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้าย

๔. สรุปข้อสั่งการ

- ๔.๑ สร้างการรับรู้นิยามการเฝ้าระวัง ASF กับ ปศจ./เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๒ เตรียมความพร้อมในการจัดทำฟาร์ม/พื้นที่เขต/ระบบ Compartment ปลอดภัย ASF
- ๔.๓ ประกาศเขตเฝ้าระวัง ASF ทั่วประเทศ ให้ปศจ.กำกับ ติดตามผลจากปศจ.พื้นที่รับผิดชอบ (อยู่ระหว่างหารือ)
- ๔.๔ เตรียมพร้อมควบคุมการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกเขต โดยใช้ข้อมูลจาก E-Movement
- ๔.๕ ชะลอการเคลื่อนย้ายสุกรจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา ไปพื้นที่ปศจ. ๒ และ ๗
- ๔.๖ ดำเนินการขึ้นทะเบียนรถจับสุกร และให้ความรู้เรื่อง Biosecurity รถจับสุกร พร้อมรายงานผลการขึ้นทะเบียนให้สคบ.ทราบ

๔.๗ เข้มงวด และให้ความรู้เรื่อง Biosecurity ของฟาร์มในสถานศึกษา ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพท.)

ต่างๆ โครงการอื่นๆที่จังหวัดส่งเสริม พร้อมโครงการพระราชดำริในจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรภายในโครงการ

๔.๘ ดำเนินการติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้า-ออกในโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งทั่วประเทศ

๔.๙ ให้บังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์ที่ดำเนินการผิดกฎหมาย และตรวจสอบใบอนุญาต


สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

๔.๑๐ ขอความร่วมมือรถขนส่งอาหารสัตว์ เรื่องสุขลักษณะอนามัยของพนักงาน ตั้งจุดพ่นยา ฆ่าเชื้อ รวมถึงใช้รถทอยขนส่งอาหารสัตว์ และทำหนังสือถึงบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ ให้ผลิตอาหารสัตว์ให้พอดีกับปริมาณการผลิตสุกร เพื่อป้องกันการลักลอบนำไปจำหน่ายให้เกษตรกรรายย่อย

วาระที่ 3.1 นิยามโรค

นิยามเดิม	นิยามใหม่
ตายเฉียบพลัน > 5% ใน 2 วัน หรือในรายย่อยตั้งแต่ 2 ตัว ใน 1 วัน	ตายเฉียบพลัน > 5% ใน 1 วัน หรือในรายย่อยหากพบว่ามีรายตายเฉียบพลัน 1 ตัว
อาการทางคลินิก ใช้สูง มีผื่นแดง หรือมีจุดเลือดออก/รอยช้ำที่ ใบหู ช่อง มีอาการไอ หรือ ขาหลังไม่มีแรง	อาการทางคลินิก ใช้สูง มีผื่นแดง หรือมีจุดเลือดออก/รอยช้ำที่ ใบหู ช่อง มีอาการไอ หรือ ขาหลังไม่มีแรง

หลักการการขอรับรองระบบความปลอดภัยโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร update : Nov 2020



ศัพท์ที่พร้อม	กลางที่พร้อม	ปลายทางที่พร้อม
หีวจังหวัด	เจ้าหน้าที่ตรวจโรคสัตว์บนผลิตภัณฑ์ของสัตว์ (ซากสัตว์ในโรง)	หากพบว่ามีรายเสียชีวิตในทันที ให้ส่งตัวอย่างเนื้อสุกรพร้อมฟาร์มที่เข้าโรงในปริมาณที่ จำนวน 5 ตัวอย่าง ร่วมกับ surface swab 5 ชุด ในบริเวณสถานที่จำหน่าย
หากพบความผิดปกติจากนิยาม	แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดด้วย	ส่งตัวอย่างเนื้อสุกร 1 ครั้ง
- เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรปศ 1 ไม่เกิน ๓ วัน - ตัวอย่างเนื้อสุกรพร้อมฟาร์มที่เข้าโรง - Surface swab บริเวณที่พบสุกรบริเวณรอบๆ 5 ชุด	หากพบว่ามีรายเสียชีวิตในทันที ให้ส่งตัวอย่างเนื้อสุกรพร้อมฟาร์มที่เข้าโรงในปริมาณที่ จำนวน 5 ตัวอย่าง ร่วมกับ surface swab ๕ ชุด ในบริเวณสถานที่จำหน่าย	ส่งตัวอย่างเนื้อสุกร 1 ครั้ง

รับแจ้งพบอาหารสัตว์ หากพบว่ามีรายเสียชีวิตโรค ASF ให้ดำเนินการสอบสวนหาประวัติการซื้อเนื้อไปสุกรในท้องถิ่นและประวัติปศจ.ที่จำหน่าย



32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
0-3425-0982 0-3425-7703

