



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๑
ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว ๒๐๖๐๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เน้นย้ำแนวทางการควบคุมโรคคหิวแอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร

เรียน ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙

ด้วยประเทศไทยพบการระบาดของโรคคหิวแอฟริกาในสุกรเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบันพบการระบาดแล้ว ๓๓ จังหวัดและสามารถควบคุมให้โรคสงบได้แล้ว ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศในขณะนี้อยู่ในสถานะเฝ้าระวังตั้งนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคคหิวแอฟริกาในสุกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจำกัดขอบเขตของการระบาดและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จึงควรให้มีการเน้นย้ำแนวทางการควบคุมโรคคหิวแอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร กรณีพบผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการในฟาร์มสุกร ดังนี้

ข้อ ๑. ดำเนินการลดความเสี่ยงภายในฟาร์มสุกรที่พบผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

๑.๑ กรณีเป็นฟาร์มสุกรหรือหมูปารายย่อยและรายเล็ก ให้ดำเนินการทำลายสุกรหรือหมูป่าทุกตัว รวมถึงซากสุกรหรือหมูป่าและสิ่งของอื่นใดภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมและให้خذใช้ราคาสัตว์และสิ่งของที่ถูกทำลายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ กรณีเป็นฟาร์มสุกรรายกลางและรายใหญ่ ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการจัดการฟาร์ม และความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์ม ประกอบการพิจารณาทำลายสุกร โดยให้พิจารณาทำลายสุกรที่แสดงอาการป่วยตามนิยามเป็นลำดับแรก และให้ดำเนินการต่อไปนี้

๑.๒.๑ สุกรหย่านม สุกรรุ่นและสุกรขุน ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ำลายในสุกรที่แสดงอาการผิดปกติหรือมีอาการตามนิยามทุกโรงเรือน ๑ ละ ๑๕ ตัว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างพื้นผิวโรงเรือนใน ๓ บริเวณ ๑ ละ ๕ ตำแหน่ง ๑ ละ ๑ ตารางฟุต หากพบผลการตรวจเป็นบวกในโรงเรือนใด ให้เก็บตัวอย่างพื้นผิวซ้ำอีกครั้งในทุกคอกย่อย ๑ ละ ๑๕ ตำแหน่ง ๑ ละ ๑ ตารางฟุตในโรงเรือนนั้น หากคอกย่อยใดให้ผลบวกให้ทำลายเฉพาะสุกรในคอกย่อยนั้น

๑.๒.๒ สุกรพันธุ์ ที่เลี้ยงแบบกรงตับและมีระบบการให้อาหารและน้ำแบบราง ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ำลายทุก ๑๐ ตัว เก็บตัวอย่าง ๕ ตัว หากพบผลการตรวจเป็นบวกให้ทำลายสุกรชุดนั้นทันที (๑๐ ตัว)

ข้อ ๒. สังกักสุกรในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค

ข้อ ๓. ดำเนินการลดความเสี่ยงภายในฟาร์มสุกรที่อยู่ในรัศมี ๑ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค โดยเจรจาดำเนินการตามข้อ ๑ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มแก่เกษตรกรและเฝ้าระวังสุกรป่วยตายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน

ข้อ ๔. ดำเนินการเฝ้าระวังสุกรป่วยตายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ภายในฟาร์มสุกรที่อยู่ในรัศมี ๑ - ๕ กิโลเมตร รอบฟาร์มเกิดโรค ทั้งนี้ถ้าสัตวแพทย์เห็นควรให้มีการลดความเสี่ยงภายในฟาร์มเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคคหิวแอฟริกาในสุกรให้ดำเนินการตามข้อ ๑

ข้อ ๕ ประชาสัมพันธ์ การพบการระบาดของโรคและให้ประชาชนเฝ้าสังเกตอาการสุกรของตนเป็นประจำ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม ฟันน้ำยาหรือวิธีการอื่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคทั้งที่ตัวคนและสิ่งของก่อนเข้าฟาร์ม ใช้อาหารเลี้ยงสุกรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หากพบสุกรแสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ใกล้ที่สุด หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายปิยะสัน โยธกล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์